



Protocolo 1000

3 gotas de activado AMS cada hora, durante **8 horas** al día, durante **3 semanas**.

Sin embargo, muchas personas no pueden empezar a tomar tantas gotas y deben empezar con sólo 2 o incluso 1 gota por hora. Esto se determina por lo enfermo que son, para empezar. Si uno se siente muy enfermo, entonces comenzar con 1 gota por hora o incluso media gota por hora, pero luego comenzará a tomar más si usted siente que puede. La regla es, si usted siente que las gotas están haciendo sentir peor, tomar menos y si no están haciendo sentir peor que tener un poco más de una hora, pero nunca más de 3 gotas por hora.

La forma de lograr la activación:

En primer lugar, introduzca su número de gotas de NaClO₂ a un vaso limpio y seco, a continuación, activar la siguiente manera: añadir una gotas de ACTIVADOR (ácido clorhídrico 4%) por cada gota de NaClO₂ en el vaso, y luego sacudir o agitar para mezclar, esperar 30 segundos, agregue 1 / 2 a 1 vaso de agua o jugo y beber.

No use jugo de naranja. No utilice zumos con adición de vitamina C o ácido ascórbico añadido. No use jugos concentrados que debe tener el agua añadida para ellos. Los jugos frescos son los mejores.

Pero si usted no quiere hacer una sola dosis cada hora, usted puede hacer 8 dosis por la mañana, y mantener la solución en un recipiente cerrado durante todo el día. Sólo tienes que seguir las instrucciones anteriores se multiplican todas las figuras por 8 y luego poner ese líquido en un recipiente cerrado. Tome 1/8 cada hora.

No te preocupes, el AMS durará mas horas que se necesita, cuando mantenga la tapa cerrada.



Ahora, estas son las instrucciones importantes que usted debe estar seguro de seguir:

- No debe hacerse más enfermo de lo que ya son: no causan a ti mismo una gran cantidad de náuseas o dolor, o diarrea. Cuando usted nota cualquiera de estos síntomas, toma menos AMS.
- Trate de no dejar de tomar AMS, solo toma menos. Baja de 2 gotas de una hora de NaClO₂ activado, a una gota por hora cuando es necesario. O si ya estás, toma una sola gota por hora, luego toma medio gota por hora, o incluso cuarta gota por hora. No causa diarrea si usted mismo se puede evitar tomando menos AMS.
- El dolor, diarrea, náuseas y otras molestias causan pérdida de energía, que a su vez provoca más una curación y recuperación más lenta. Por otra parte trata de aumentar la cantidad de gotas que está tomando hasta que esté tomando 3 gotas por hora, pero no subes mas que 3 gotas por hora. CONTINUE HASTA QUE ESTES BIEN.

Aquí esta cómo se lleva su dosis de 8 horas, sin tener de activarlo por hora.

Tome una botella de un litro, se divide en 8 partes iguales. Mezcla 24 gotas de NaClO₂ y 24 gotas de Activador (ácido clorhídrico 4%). Agitar o mezclar y esperar 30 segundos. Llena la botella con agua o jugo (sin vitamina C o ácido ascórbico) y tendrás una línea de 3 gotas de AMS por hora.

NOTA: Este botella de AMS activada tendrá una duración de hasta 5 días en la nevera. Encontramos que mientras usted activa NaClO₂ y no entra un contacto con un patógeno, el dióxido de cloro no se libera.